



ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βεροίας – Αλεξάνδρειας

Τηλ. 23310 77100

URL: www.geovet.gr

Email: geovetver@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ 500 ΛΙΤ ΝΕΡΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.
Στα πρώτα 5-6 φύλλα	SUPER LIPAN FYT	2lit	Ενεργοποίηση – Ανάπτυξη ριζικού συστήματος.
Μετά 12 – 15 ημέρες (πλήρη ανάπτυξη φυλλώματος)	MIX FYT + NOVA	1ilt + 1 lit.	Βλάστηση – Καλύτερη διαμόρφωση φυτού.
Ανθοφορία	Co Bozinc + Αυξήλ	1λιτ + 250 ml	Καλύτερη ανθοφορία – «δέσιμο» κονδύλου.
Στάδιο Κονδυλοποίησης	Mare fyt	1lit	Καρπόδεση – Αύξηση Μεγέθους.
Πλήρη Διαμόρφωση Κονδύλου (Μετά 10 – 12 ημέρες)	Mare fyt + NOVA	1lit + 1lit	Αύξηση μεγέθους, παραγωγής, ποιότητα.
Μετά 15 ημέρες & μέχρι την συγκομιδή 2-3 εφαρμογές κάθε 12 – 15 μέρες.	Calco mix K+ Mg	2 lit	Καλή διατηρησιμότητα, ποιότητα.

Σημειώσεις:

1) Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών στο στάδιο της ανθοφορίας, για αποφυγή του stress – διακοπή φωτοσύνθεσης, εφαρμογή με το σκεύασμα **SUPER FLORY MIX**, με δοσολογία 2 λιτ/500 λιτ νερού, διαφυλλικά.

2) Για Καλύτερη γονιμότητα και ενίσχυση της βασικής λίπανσης, στο στάδιο διαμόρφωσης του χωραφιού, πριν την φύτευση, με ενσωμάτωση, προσθήκη εδαφοβελτιωτικού, **ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ**, σε δοσολογία, 250 kg/στρέμμα.