



## ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βεροίας – Αλεξάνδρειας

Τηλ. 23310 77100

URL: [www.geovet.gr](http://www.geovet.gr)

Email: [geovetver@gmail.com](mailto:geovetver@gmail.com)

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΟΣΗ/ΤΟΝΟ	ΣΤΟΧΟΣ
20-30 % Ανθοφορία	COBOZINC	2-3 lit	Καλή ανθοφορία – Κυτταροδιαίρεση.
Γλίστρημα Κάλυκα	Bio Mix + Super Flory Mix	1 lit + 2-3 lit	Ομοιόμορφη Καρπόδεση – Κυτταροδιαίρεση – Βλάστηση.
Μετά 15 ημέρες Μέγεθος Καρπού 2-3 cm	Bio Mix + Super Flory Mix	1 lit + 2-3 lit	Ομοιόμορφη Καρπόδεση – Κυτταροδιαίρεση – Βλάστηση.
Μέγεθος καρπού 5-6 cm, & κάθε 12-15 ημέρες 3-4 εφαρμογές μέχρι την Συγκομιδή.	Bio Calco Ή Bio Calcium	3 lit Ή 2-3 λιτ	Για αντοχή έναντι σχισίματος – Χρώμα – Πρωϊμηση.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1) Σε φάρμες με μη σωστή καρπόδεση & ανομοιογένειας Καρπού ( Προβλήματα στο μέγεθος), **Να εφαρμόζεται το σκεύασμα Mare fyt, στα στάδια, πτώσης πετάλων & μικρού Καρπιδίου, με δοσολογία, 1-2 λιτ/1000 λιτ νερού.**

2) Σε περιπτώσεις εμφάνισης Μερικού Όψιμου Παγετού, στο στάδιο Ροζ Μπουμπουκιού & Ανθοφορίας, **να εφαρμόζονται Διαφυλλικοί ψεκασμοί, 24-48 ώρες πριν την εκδήλωση του παγετού, με το σκεύασμα super flory mix, 3-5 λιτ/1000 λιτ νερού, ή αμέσως μετά τον παγετό. Αν συνεχίζεται παρατεταμένα κατά την διάρκεια ανθοφορίας ο παγετός, επιβάλλεται και 2<sup>ος</sup> ψεκασμός με την ίδια δοσολογία.**

