



## ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βεροίας – Αλεξάνδρειας

Τηλ. 23310 77100

URL: [www.geovet.gr](http://www.geovet.gr)

Email: [geovetver@gmail.com](mailto:geovetver@gmail.com)

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΟΔΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΟΣΗ ΣΤΑ 1000 ΛΙΤ ΝΕΡΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Πλήρης Ανθοφορία	COBOZINC + Αυξήλ	2 λιτ + 250 ml	Καλύτερη ανθοφορία, καρπόδεση.
Μικρό Καρπίδιο	MARE FYT	1-2 Lit	Κυτταροδιαίρεση – Αύξηση μεγέθους.
Μέγεθος 5-7 cm ( μετά 15-20 μέρες)	MARE FYT + NOVA	1Lit + 1 lit	Μέγεθος – Βλάστηση. Αύξηση Παραγωγής.
Αλλαγή Χρώματος – Ολοκλήρωση μεγέθους	CALCO MIX	3Lit	Ενίσχυση κυτταρικών τοιχωμάτων – αποφυγή σχασίματος – Χρώμα – Ποιότητα.
20 μέρες μετά	CALCO MIX	3Lit	Ενίσχυση κυτταρικών τοιχωμάτων – αποφυγή σχασίματος – Χρώμα – Ποιότητα.
10 – 12 μέρες πριν την συγκομιδή	BIO CALCIYM	5 Lit	Ενίσχυση κυτταρικών τοιχωμάτων – αποφυγή σχασίματος

#### Σημειώσεις:

Στις Αρχές του Χειμώνα, για καλύτερη γονιμότητα στο έδαφος, και ενίσχυση της βασικής λίπανσης, προσθήκη εδαφοβελτιωτικού **ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ** σε δοσολογία 3-5 kg/Δένδρο.

2) Σε περίπτωση μερικού όψιμου παγετού, στα στάδια πριν ανθοφορία και στην ανθοφορία, για κάλυψη μέχρι -2-3 C°, εφαρμογή πριν ή μετά τον παγετό, με το σκεύασμα **SUPER FLORY MIX**, με δοσολογία 3-5 λιπ/1000 λιτ νερού, και, σε πιθανόν παρατεταμένων χαμηλών θερμοκρασιών, να γίνεται και 2<sup>η</sup> εφαρμογή.