



ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βεροίας – Αλεξάνδρειας

Τηλ. 23310 77100

URL: www.geovet.gr

Email: geovetver@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΟΣΗ ΣΕ 1000 ΛΙΤ ΝΕΡΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.
Αμέσως μετά την μεταφύτευση	SUPER LIPAN FYT + ΑΥΞΗΛ	ΣΗΜ: Από το σύστημα άρδευσης – ριζοπότισμα. 4λιτ + 250 ml	Ενεργοποίηση ριζικού συστήματος – γρήγορη Ανάπτυξη φυτού.
Μετά 20 μέρες	MIX – FYT + PHOS MIX	2 Lit + 2 lit	Κάλυψη αναγκών φωσφόρου & ιχνοστοιχείων. Ανάπτυξη φυλλώματος.
Μετά 20 ήμερες	NOVA + CALCO MIX K+Mg	2lit + 3lit	Καλύτερη ανάπτυξη – κάλυψη αναγκών Βορίου, Μαγνησίου.
Μετά 20 ημέρες	POT MIX + CALCO MIX K+ Mg	2 Lit + 3 Lit	Κάλυψη Αναγκών Καλίου – Βορίου – Μαγνησίου.
Μετά 20 ημέρες	POT MIX	2 Λιτ	Κάλυψη Αναγκών Καλίου

Σημειώσεις:

Στις Αρχές του Χειμώνα, για καλύτερη γονιμότητα στο έδαφος, και ενίσχυση της βασικής Λίπανσης, προσθήκη εδαφοβελτιωτικού ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ, με ενσωμάτωση πριν την μεταφύτευση και σε συνεργεία με την βασική Λίπανση, με δοσολογία, 300 kg/στρ.

2) Σε περιπτώσεις που μετά την μεταφύτευση και τις πρώτες 20 μέρες, υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, και διακόπτεται η ανάπτυξη (διακοπή φωτοσύνθεσης), να γίνει εφαρμογή, διαφυλλικά, με το σκεύασμα **SUPER FLORY MIX**, με δοσολογία 3 λιτ/1000 λιτ νερού, για γρήγορη επανεκκίνηση της ανάπτυξης.